

Provvisori

Siete appena diventati possessori e portatori di una nuova protesi dentale provvisoria in resina acrilica.

Sarà meglio osservare alcune precauzioni di ordine generale che vanno a integrare quelle già ricevute dall'operatore riguardo all'affidabilità specifica:

- Potete sicuramente utilizzarlo per masticare tutto ciò che è commestibile, il consiglio è di evitare cibi estremamente tenaci, spesso non necessari nella Vostra dieta (frutta secca in genere, caramelle dure, ecc.) o di utilizzarlo come utensile (per aiutarsi ad aprire confezioni di plastica, ecc.).
- Esistendo una chiara ed immediata affinità fra la resina acrilica del provvisorio e le gomme alimentari (cicche, caramelle mou o gommose, torrone morbido, ecc.), al fine di pregiudicare la stabilità evitando spiacevoli "distacchi", tali alimenti sono vietati.
- La stabilità del colore dipende anche dall'uso di collutori (che andranno utilizzati solo nei modi e tempi prescritti), dall'assunzione di cibi o bevande coloranti (carciofi, liquirizia, caffè, the, ed altri) la cui assunzione andrà almeno limitata e dal fumo (sia di sigaretta che toscano o pipa).
- L'igiene orale deve essere sempre accurata e deve essere effettuata nei modi e tempi indicati; non esitate a segnalare l'eventuale difficoltà nel mantenerla (spazi non agevolmente raggiungibili, ecc).
- Questo provvisorio è stato messo a punto con tanta cura non solo perché sia naturale nel suo aspetto ed efficace nella sua funzione, ma anche per proteggere la salute dei denti preparati mantenendo stabili la loro posizione e l'occlusione garantendo la masticazione. Perciò se notate un qualsiasi sapore sospetto (di medicazione) , movimento, allentamento o rottura sarà necessario comunicarlo immediatamente perché possa essere controllato al più presto evitando amare sorprese ... (carie, fratture, spostamenti dentari, ecc).

Si ricorda che le protesi provvisorie in acrilico vanno incontro ad usure e consumazioni nel tempo spesso non avvertibili dal paziente, ma che possono causare problemi per il movimento dei "pilastri" sottostanti; pertanto vanno sostituite con delle protesi definitive.